

gitudine pericarpii: centrales breviores. Pericarpia tetragona membrana quadridentata coronata.

*laciniata* L., foliis imis pinnatifidis: laciniis incisis: extima tripartita: supremis tripartitis: supra retrofusum scabris. infra subscabris. *Icon Morison. III. Sect. 6. Tab. 6.* fig. 53. 54.

h. H. Perennis.

### ECHINACEA.

Flores radiati neutri steriles: disci hermaphroditi fertiles. Calyx triplici serie polyphyllus: laciniis lanceolatis subsquarrosois in paleas degenerantibus. Corollulae radii longissimae lineares bidentatae deflexae. Receptaculum ovatum paleis flosculis disci longioribus rigidis superne cartilagineis. Pericarpia tetragona margine foliaceo multifido coronata.

*purpurea*, foliis ovato lanceolatis ferratis alternis: radio purpureo. *Rudbeckia purpurea*. Linn.

*Dracunculus Virginianus latifolius*: petalis florum longissimis purpurascensibus. *Morison. III. Sect 6. Tab. 9.*

Corollulae disci virides. Paleae basi virides: medio luteae: apice rubellae.

A *Rudbeckia* differt figura calycis, receptaculi, palearum, et corona pericarpii.

h. H. Perennis.

### BUPHTHALMUM. *Linnaei. Gaertner. 2. p.*

434. *Tab. 169.*

Flores radii feminei: disci hermaphroditi utrique fertiles. Calyx tubhemisphaericus, dupli serie polyphyllus radio corollae brevior. Receptaculum subconvexum. Pericarpia difformia: radii majora triquetra recta: disci minora incurva tri-tetragona, coronata membrana dentata.

*frutesc.*